

<i>Anasimyia contracta</i> (Claussen & Torp, 1980)	<i>Chrysogaster coemiteriorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lejogaster tarsata</i> (Megerle in Meigen, 1822)	<i>Platycbeirus albimanus</i> (Fabricius, 1781)
<i>Anasimyia interpuncta</i> (Harris, 1776)	<i>Chrysogaster solstitialis</i> (Fallén, 1817)	<i>Lejops vittata</i> (Meigen, 1822)	<i>Platycbeirus ambiguus</i> (Fallén, 1817)
<i>Anasimyia lineata</i> (Fabricius, 1787)	<i>Chrysogaster virescens</i> (Loew, 1854)	<i>Lejota ruficornis</i> (Zetterstedt, 1843)	<i>Platycbeirus angustatus</i> (Zetterstedt, 1843)
<i>Anasimyia lunulata</i> (Meigen, 1822)	<i>Chrysotoxum bicinctum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Leucozona glaucia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Platycbeirus aurolateralis</i> (Stubbs, 2002)
<i>Anasimyia transfuga</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chrysotoxum cautum</i> (Harris, 1776)	<i>Leucozona inopinata</i> (Doczkal, 2000)	<i>Platycbeirus clypeatus</i> (Meigen, 1822)
<i>Arctophila bombiformis</i> (Fallén, 1810)	<i>Chrysotoxum elegans</i> (Loew, 1841)	<i>Leucozona laternaria</i> (Müller, 1776)	<i>Platycbeirus complicatus</i> (Becker, 1889)
<i>Arctophila superbiens</i> (Müller, 1776)	<i>Chrysotoxum fasciatum</i> (Müller, 1764)	<i>Leucozona lucorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Platycbeirus discimanus</i> (Loew, 1871)
<i>Baccha elongata</i> (Fabricius, 1775)	<i>Chrysotoxum fasciolatum</i> (De Geer, 1776)	<i>Mallota cimbiciformis</i> (Fallén, 1817)	<i>Platycbeirus europaeus</i> (Goeldin, Maibach & Speight, 1990)
<i>Blera fallax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chrysotoxum festivum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mallota fuciformis</i> (Fabricius, 1794)	<i>Platycbeirus fulviventris</i> (Macquart, 1829)
<i>Brachyopa bicolor</i> (Fallén, 1817)	<i>Chrysotoxum intermedium</i> (Meigen, 1822)	<i>Mallota megilliformis</i> (Fallén, 1817)	<i>Platycbeirus granditarsus</i> (Forster, 1771)
<i>Brachyopa dorsata</i> (Zetterstedt, 1837)	<i>Chrysotoxum lineare</i> (Zetterstedt, 1819)	<i>Mallota tricolor</i> (Loew, 1871)	<i>Platycbeirus immarginatus</i> (Zetterstedt, 1849)
<i>Brachyopa grunewaldensis</i> (Kassebeer, 2000)	<i>Chrysotoxum octomaculatum</i> (Curtis, 1837)	<i>Melangyna barbifrons</i> (Fallén, 1817)	<i>Platycbeirus manicatus</i> (Meigen, 1822)
<i>Brachyopa insensilis</i> (Collin, 1939)	<i>Chrysotoxum vernale</i> (Loew, 1841)	<i>Melangyna compositarum</i> (Verrall, 1873)	<i>Platycbeirus melanopsis</i> (Loew, 1856)
<i>Brachyopa maculipennis</i> (Thompson & Torp, 1982)	<i>Chrysotoxum verralli</i> (Collin, 1940)	<i>Melangyna lasiophthalma</i> (Zetterstedt, 1843)	<i>Platycbeirus occultus</i> (Goeldin, Maibach & Speight, 1990)
<i>Brachyopa obscura</i> (Thompson & Torp, 1982)	<i>Criorbina asilica</i> (Fallén, 1816)	<i>Melangyna lucifera</i> (Nielsen, 1980)	<i>Platycbeirus parmatius</i> (Rondani, 1857)
<i>Brachyopa panzeri</i> (Goffe, 1945)	<i>Criorbina berberina</i> (Fabricius, 1805)	<i>Melangyna quadrimaculata</i> (Verrall, 1873)	<i>Platycbeirus peltatus</i> (Meigen, 1822)
<i>Brachyopa pilosa</i> (Collin, 1939)	<i>Criorbina floccosa</i> (Meigen, 1822)	<i>Melangyna umbellatarum</i> (Fabricius, 1794)	<i>Platycbeirus perpallidus</i> (Verrall, 1901)
<i>Brachyopa scutellaris</i> (Robineau-Desvoidy, 1843)	<i>Criorbina pachymera</i> (Egger, 1858)	<i>Melanogaster aerea</i> (Loew, 1843)	<i>Platycbeirus podagratus</i> (Zetterstedt, 1836)
<i>Brachyopa testacea</i> (Fallén, 1817)	<i>Criorbina ranunculi</i> (Panzer, 1804)	<i>Melanogaster curvistylus</i> (Vujčić & Stuke, 1998)	<i>Platycbeirus rosarum</i> (Fabricius, 1787)
<i>Brachyopa vittata</i> (Zetterstedt, 1843)	<i>Dasysyrphus albostratus</i> (Fallén, 1817)	<i>Melanogaster birtella</i> (Loew, 1843)	<i>Platycbeirus scambus</i> (Staeger, 1843)
<i>Brachypalpus lentus</i> (Meigen, 1822)	<i>Dasysyrphus friuliensis</i> (van der Goot, 1960)	<i>Melanogaster nuda</i> (Maquart, 1829)	<i>Platycbeirus scutatus</i> (Meigen, 1822)
<i>Brachypalpus chrysites</i> (Egger, 1859)	<i>Dasysyrphus hilaris</i> (Zetterstedt, 1843)	<i>Melanogaster parumplicata</i> (Loew, 1840)	<i>Platycbeirus splendidus</i> (Rotheray, 1998)
<i>Brachypalpus lapbriformis</i> (Fallén, 1816)	<i>Dasysyrphus lenensis</i> (Bagatschanowa, 1980)	<i>Melanostoma dubium</i> (Verrall, 1873)	<i>Platycbeirus sticticus</i> (Meigen, 1822)
<i>Brachypalpus valgus</i> (Panzer, 1798)	<i>Dasysyrphus paucillius</i> (Williston, 1887)	<i>Melanostoma mellinum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Platycbeirus tarsalis</i> (Schummel, 1837)
<i>Caliprobola speciosa</i> (Rossi, 1790)	<i>Dasysyrphus pinastri</i> (De Geer, 1776)	<i>Melanostoma scalare</i> (Fabricius, 1794)	<i>Platycbeirus tetricus</i> (Dušek & Láská, 1982)
<i>Callicera aenea</i> (Fabricius, 1781)	<i>Dasysyrphus postclaviger</i> (Stys & Moucha, 1962)	<i>Meligramma cincta</i> (Fallén, 1817)	<i>Platycbeirus transfugus</i> (Zetterstedt, 1838)
<i>Callicera rufa</i> (Schummel, 1842)	<i>Dasysyrphus tricinctus</i> (Fallén, 1817)	<i>Meligramma cingulata</i> (Egger, 1860)	<i>Pocota personata</i> (Harris, 1780)
<i>Ceriana conopsoidea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Dasysyrphus venustus</i> (Meigen, 1822)	<i>Meligramma guttata</i> (Fallén, 1817)	<i>Portevinia maculata</i> (Fallén, 1817)
<i>Chalcosyrphus eunotus</i> (Loew, 1873)	<i>Didea alneti</i> (Fallén, 1817)	<i>Meligramma triangulifera</i> (Zetterstedt, 1843)	<i>Psarus abdominalis</i> (Fabricius, 1794)
<i>Chalcosyrphus femoratus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Didea fasciata</i> (Macquart, 1834)	<i>Meliscaeva auricollis</i> (Meigen, 1822)	<i>Psilota anthracina</i> (Meigen, 1822)
<i>Chalcosyrphus nemorum</i> (Fabricius, 1805)	<i>Didea intermedia</i> (Loew, 1854)	<i>Meliscaeva cinctella</i> (Zetterstedt, 1843)	<i>Psilota atra</i> (Fallén, 1817)
<i>Chalcosyrphus piger</i> (Fabricius, 1794)	<i>Doros profuges</i> (Harris, 1780)	<i>Merodon aeneus</i> (Meigen, 1822)	<i>Psilota innupta</i> (Rondani, 1857)
<i>Chalcosyrphus rufipes</i> (Loew, 1873)	<i>Epistrophe cryptica</i> (Doczkal & Schmidt, 1994)	<i>Merodon avidus</i> (Rossi, 1790)	<i>Rhingia borealis</i> (Rhingdahl, 1928)

<i>Chalcosyrphus valgus</i> (Gmelin, 1790)	<i>Epistrophe diaphana</i> (Zetterstedt, 1843)	<i>Merodon constans</i> (Rossi, 1794)	<i>Rhingia campestris</i> Meigen, 1822
<i>Chamaesyrphus lusitanicus</i> Mik, 1898	<i>Epistrophe eligans</i> (Harris, 1780)	<i>Merodon equestris</i> (Fabricius, 1794)	<i>Rhingia rostrata</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Chamaesyrphus scaevoides</i> (Fallén, 1817)	<i>Epistrophe euchroma</i> (Kowarz, 1885)	<i>Merodon funestus</i> (Fabricius, 1794)	<i>Riponnensia splendens</i> (Meigen, 1822)
<i>Cheilosia aerea</i> Dufour, 1848	<i>Epistrophe flava</i> Doczkal & Schmid, 1994	<i>Merodon ruficornis</i> Meigen, 1822	<i>Scaeva pyrastris</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Cheilosia albipila</i> Meigen, 1822	<i>Epistrophe grossulariae</i> (Meigen, 1822)	<i>Merodon rufus</i> Meigen, 1822	<i>Scaeva selenitica</i> (Meigen, 1822)
<i>Cheilosia albitarsis</i> (Meigen, 1822)	<i>Epistrophe leiophthalma</i> (Schiner & Egger, 1853)	<i>Mesembrius peregrinus</i> (Loew, 1846)	<i>Sericomyia lappona</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Cheilosia antiqua</i> (Meigen, 1822)	<i>Epistrophe melanostoma</i> (Zetterstedt, 1843)	<i>Microdon analis</i> (Macquart, 1842)	<i>Sericomyia silentis</i> (Harris, 1776)
<i>Cheilosia barbata</i> Loew, 1857	<i>Epistrophe nitidicollis</i> (Meigen, 1822)	<i>Microdon devius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Spazigaster ambulans</i> (Fabricius, 1798)
<i>Cheilosia bergenstammi</i> Becker, 1894	<i>Epistrophe obscuripes</i> (Strobl, 1910)	<i>Microdon miki</i> Doczkal Schmidt, 1999	<i>Sphaerophoria batava</i> Goeldlin, 1974
<i>Cheilosia brachysoma</i> Egger, 1860	<i>Epistrophe ochrostoma</i> (Zetterstedt, 1849)	<i>Microdon mutabilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sphaerophoria fatarum</i> Goeldlin de Tiefenau, 1989
<i>Cheilosia caeruleascens</i> (Meigen, 1822)	<i>Episyrphus balteatus</i> (De Geer, 1776)	<i>Microdon myrmicae</i> Schönrogge, Barr, Wardlaw, Napper, Gardner, Breen, Elmes & Thoma 2002	<i>Sphaerophoria interrupta</i> (Fabricius, 1805)
<i>Cheilosia canicularis</i> (Panzer, 1801)	<i>Eriozona erratica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Myathropa florea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sphaerophoria loewi</i> Zetterstedt, 1843
<i>Cheilosia carbonaria</i> Egger, 1860	<i>Eriozona syrphoides</i> (Fallén, 1817)	<i>Myolepta dubia</i> (Fabricius, 1805)	<i>Sphaerophoria philantha</i> (Meigen, 1822)
<i>Cheilosia chloris</i> (Meigen, 1822)	<i>Eristalinus aeneus</i> (Scopoli, 1763)	<i>Myolepta potens</i> (Harris, 1776)	<i>Sphaerophoria rueppelli</i> (Wiedemann, 1830)
<i>Cheilosia chrysocoma</i> (Meigen, 1822)	<i>Eristalinus sepulchralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Myolepta vara</i> (Panzer, 1798)	<i>Sphaerophoria scripta</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Cheilosia cynocephala</i> Loew, 1840	<i>Eristalis abusiva</i> Collin, 1931	<i>Neoascia annexa</i> (Müller, 1776)	<i>Sphaerophoria taeniata</i> (Meigen, 1822)
<i>Cheilosia derasa</i> Loew, 1857	<i>Eristalis alpina</i> (Panzer, 1798)	<i>Neoascia geniculata</i> (Meigen, 1822)	<i>Sphaerophoria virgata</i> Goeldlin, 1974
<i>Cheilosia fasciata</i> Schiner & Egger, 1853	<i>Eristalis anthophorina</i> (Fallén, 1817)	<i>Neoascia interrupta</i> (Meigen, 1822)	<i>Sphecomyia vespiformis</i> (Gorski 1852)
<i>Cheilosia flavipes</i> (Panzer, 1794)	<i>Eristalis arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Neoascia meticulosa</i> (Scopoli, 1763)	<i>Spbegina clunipes</i> (Fallén, 1816)
<i>Cheilosia fraterna</i> (Meigen, 1830)	<i>Eristalis cryptarum</i> (Fabricius, 1794)	<i>Neoascia obliqua</i> Coe, 1940	<i>Spbegina elegans</i> Schummel, 1843
<i>Cheilosia frontalis</i> Loew, 1857	<i>Eristalis interrupta</i> (Poda, 1761)	<i>Neoascia podagrica</i> (Fabricius, 1775)	<i>Spbegina latifrons</i> Egger, 1865
<i>Cheilosia gagatea</i> Loew, 1857	<i>Eristalis intricaria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Neoascia tenur</i> (Harris, 1780)	<i>Spbegina sibirica</i> Stackelberg, 1953
<i>Cheilosia gigantea</i> (Zetterstedt, 1838)	<i>Eristalis jugorum</i> Egger, 1858	<i>Neoascia unifasciata</i> (Strobl, 1898)	<i>Spbegina spbeginea</i> (Zetterstedt, 1838)
<i>Cheilosia grisella</i> Becker, 1894	<i>Eristalis lineata</i> (Harris, 1776)	<i>Orthonevra brevicornis</i> Loew, 1843	<i>Spbegina verecunda</i> Collin, 1937
<i>Cheilosia grossa</i> (Fallén, 1817)	<i>Eristalis obscura</i> Loew, 1866	<i>Orthonevra elegans</i> (Meigen, 1822)	<i>Sphiximorpha subsessilis</i> (Illiger in Rossi, 1807)
<i>Cheilosia bercyniae</i> Loew, 1857	<i>Eristalis oestracea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Orthonevra erythrogonia</i> (Malm, 1863)	<i>Spilomyia diophthalma</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Cheilosia himantopa</i> (Panzer, 1798)	<i>Eristalis pertinax</i> (Scopoli, 1763)	<i>Orthonevra frontalis</i> (Loew, 1843)	<i>Spilomyia manicata</i> (Rondani, 1865)
<i>Cheilosia illustrata</i> (Harris, 1780)	<i>Eristalis picea</i> (Fallén, 1817)	<i>Orthonevra geniculata</i> (Meigen, 1830)	<i>Syritta pipiens</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Cheilosia impressa</i> Loew, 1840	<i>Eristalis rupium</i> Fabricius, 1805	<i>Orthonevra incisa</i> Loew, 1843	<i>Syrphus attenuatus</i> Hine, 1922
<i>Cheilosia impudens</i> Becker, 1894	<i>Eristalis similis</i> (Fallén, 1817)	<i>Orthonevra intermedia</i> Lundbeck, 1916	<i>Syrphus ribesii</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Cheilosia insignis</i> Loew, 1857	<i>Eristalis tenax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Orthonevra nobilis</i> (Fallén, 1817)	<i>Syrphus sexmaculatus</i> (Zetterstedt, 1838)
<i>Cheilosia laeviventris</i> Loew, 1857	<i>Eumerus flavitarsis</i> Zetterstedt, 1843	<i>Orthonevra plumbago</i> Loew, 1840	<i>Syrphus torvus</i> Osten-Sacken, 1875
<i>Cheilosia lasiopa</i> Kowarz, 1885	<i>Eumerus funeralis</i> Meigen, 1822	<i>Paragus albifrons</i> (Fallén, 1817)	<i>Syrphus vitripennis</i> Meigen, 1822

<i>Cheilosia laticornis</i> Rondani, 1857	<i>Eumerus grandis</i> Meigen, 1822	<i>Paragus bicolor</i> (Fabricius, 1794)	<i>Temnostoma apiforme</i> (Fabricius, 1794)
<i>Cheilosia latifrons</i> (Zetterstedt, 1843)	<i>Eumerus ornatus</i> Meigen, 1822	<i>Paragus constrictus</i> Šimic, 1986	<i>Temnostoma bombylans</i> (Fabricius, 1805)
<i>Cheilosia lenis</i> Becker, 1894	<i>Eumerus ovatus</i> Loew, 1848	<i>Paragus finitimus</i> Goeldlin, 1971	<i>Temnostoma meridionale</i> Krivoshchina & Mamayev, 1962
<i>Cheilosia loewi</i> (Becker, 1894)	<i>Eumerus ruficornis</i> Meigen, 1822	<i>Paragus haemorrhous</i> Meigen, 1822	<i>Temnostoma vespiforme</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Cheilosia longula</i> (Zetterstedt, 1838)	<i>Eumerus sabulorum</i> (Fallén, 1817)	<i>Paragus pecciolii</i> Rondani, 1857	<i>Trichopsomyia flavitarsis</i> (Meigen, 1822)
<i>Cheilosia melanopa</i> (Zetterstedt, 1843)	<i>Eumerus sogdianus</i> Stackelberg, 1952	<i>Paragus quadrifasciatus</i> Meigen, 1822	<i>Trichopsomyia joratensis</i> Goeldlin, 1977
<i>Cheilosia melanura</i> (Becker, 1894)	<i>Eumerus strigatus</i> (Fallén, 1817)	<i>Paragus tibialis</i> (Fallén, 1817)	<i>Triglyphus primus</i> Loew, 1840
<i>Cheilosia montana</i> Egger, 1860	<i>Eumerus tarsalis</i> Loew, 1848	<i>Parasyrphus annulatus</i> (Zetterstedt, 1838)	<i>Tropidia fasciata</i> Meigen, 1822
<i>Cheilosia morio</i> (Zetterstedt, 1838)	<i>Eumerus tricolor</i> (Fabricius, 1798)	<i>Parasyrphus kirgizorum</i> (Peck, 1969)	<i>Tropidia scita</i> (Harris, 1780)
<i>Cheilosia mutabilis</i> (Fallén, 1817)	<i>Eupeodes bucculatus</i> (Rondani, 1857)	<i>Parasyrphus lineolus</i> (Zetterstedt, 1843)	<i>Volucella bombylans</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Cheilosia nebulosa</i> (Verrall, 1871)	<i>Eupeodes corollae</i> (Fabricius, 1794)	<i>Parasyrphus macularis</i> (Zetterstedt, 1843)	<i>Volucella inanis</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Cheilosia nigripes</i> (Meigen, 1822)	<i>Eupeodes goeldlini</i> Mazanek, Laska & Blicik, 1999	<i>Parasyrphus malinellus</i> (Collin, 1952)	<i>Volucella inflata</i> (Fabricius, 1775)
<i>Cheilosia ortotricha</i> Vujić & Claussen, 1994	<i>Eupeodes lapponicus</i> (Zetterstedt, 1838)	<i>Parasyrphus nigratarsis</i> (Zetterstedt, 1843)	<i>Volucella pellucens</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Cheilosia pagana</i> (Meigen, 1822)	<i>Eupeodes latifasciatus</i> (Macquart, 1829)	<i>Parasyrphus punctulatus</i> (Verrall, 1873)	<i>Volucella zonaria</i> (Poda, 1761)
<i>Cheilosia pascuorum</i> Becker, 1894	<i>Eupeodes lundbecki</i> (Soot-Ryen, 1946)	<i>Parasyrphus vittiger</i> (Zetterstedt, 1843)	<i>Xanthandrus comtus</i> (Harris, 1780)
<i>Cheilosia personata</i> Loew, 1857	<i>Eupeodes luniger</i> (Meigen, 1822)	<i>Parhelophilus consimilis</i> (Malm, 1863)	<i>Xanthogramma citrofasciatum</i> (De Geer, 1776)
<i>Cheilosia pini</i> Becker, 1894	<i>Eupeodes nielsenii</i> (Dušek & Láska, 1976)	<i>Parhelophilus frutetorum</i> (Fabricius, 1775)	<i>Xanthogramma laetum</i> (Fabricius, 1794)
<i>Cheilosia proxima</i> (Zetterstedt, 1843)	<i>Eupeodes nitens</i> (Zetterstedt, 1843)	<i>Parhelophilus versicolor</i> (Fabricius, 1794)	<i>Xanthogramma pedissequum</i> (Harris, 1776)
<i>Cheilosia psiloptalma</i> (Becker, 1894)	<i>Ferdinandea cuprea</i> (Scopoli, 1763)	<i>Pelecocera trincta</i> Meigen, 1822	<i>Xanthogramma stackelbergi</i> Virolvitsh 1975
<i>Cheilosia pubera</i> (Zetterstedt, 1838)	<i>Ferdinandea ruficornis</i> (Fabricius, 1775)	<i>Pipiza accola</i> Virolvitsh, 1985	<i>Xylota abiens</i> Meigen, 1822
<i>Cheilosia rhynchops</i> Egger, 1860	<i>Hammerschmidtia ferruginea</i> (Fallén, 1817)	<i>Pipiza austriaca</i> Meigen, 1822	<i>Xylota florum</i> (Fabricius, 1805)
<i>Cheilosia rufimana</i> Becker, 1894	<i>Helophilus affinis</i> Wahlberg, 1844	<i>Pipiza bimaculata</i> Meigen, 1822	<i>Xylota ignava</i> (Panzer, 1798)
<i>Cheilosia sahlbergi</i> Becker, 1894	<i>Helophilus bottnicus</i> Wahlberg, 1844	<i>Pipiza fasciata</i> Meigen, 1822	<i>Xylota jakutorum</i> Bagatshanova, 1980
<i>Cheilosia scanica</i> Rhingdahl, 1937	<i>Helophilus hybridus</i> Loew, 1846	<i>Pipiza fenestrata</i> Meigen, 1822	<i>Xylota meigeniana</i> (Stackelberg, 1964)
<i>Cheilosia scutellata</i> (Fallén, 1817)	<i>Helophilus pendulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipiza festiva</i> Meigen, 1822	<i>Xylota segnis</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Cheilosia semifasciata</i> Becker, 1894	<i>Helophilus trivittatus</i> (Fabricius, 1805)	<i>Pipiza lugubris</i> (Fabricius, 1775)	<i>Xylota sylvarum</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Cheilosia soror</i> (Zetterstedt, 1843)	<i>Heringia brevidens</i> (Egger, 1865)	<i>Pipiza luteitarsis</i> Zetterstedt, 1843	<i>Xylota tarda</i> Meigen, 1822
<i>Cheilosia subpictipennis</i> Claussen, 1998	<i>Heringia fulvimana</i> (Zetterstedt, 1843)	<i>Pipiza noctiluca</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Xylota xanthocnema</i> Collin, 1939
<i>Cheilosia urbana</i> (Meigen, 1822)	<i>Heringia heringi</i> (Zetterstedt, 1843)	<i>Pipiza quadrimaculata</i> (Panzer, 1804)	
<i>Cheilosia variabilis</i> (Panzer, 1798)	<i>Heringia latitarsis</i> (Egger, 1865)	<i>Pipizella annulata</i> (Macquart, 1829)	
<i>Cheilosia velutina</i> Loew, 1840	<i>Heringia pubescens</i> (Delicchi & Pschorn-Walcher, 1955)	<i>Pipizella divicoi</i> (Goeldlin, 1974)	
<i>Cheilosia vernalis</i> (Fallén, 1817)	<i>Heringia verrucula</i> (Collin, 1931)	<i>Pipizella mongolorum</i> Stackelberg, 1952)	
<i>Cheilosia vicina</i> (Zetterstedt, 1849)	<i>Heringia vitripennis</i> (Meigen, 1822)	<i>Pipizella viduata</i> (Linnaeus, 1758)	

<i>Cheilisia vulpina</i> (Meigen, 1822)	<i>Lejogaster metallina</i> (Fabricius, 1781)	<i>Pipizella virens</i> (Fabricius, 1805)
--	--	--